

La complétude de l'espace vectoriel $\mathcal{C}_b(X, B)$ des applications continues et bornées d'une partie X d'un espace vectoriel normé, à valeurs dans un espace de Banach B (réel ou complexe), muni de la norme uniforme, n'est au programme qu'en filière MP*. Autrement dit, il n'y a que pour l' X et les ENS où ce théorème doit être connu (et peut être utilisé). Ici, avec $X = J$ et $B = \mathbb{C}$, ce théorème donne immédiatement la complétude de E .

De même, si G est un espace vectoriel normé quelconque et F un espace de Banach, la complétude de $\mathcal{L}(G, F)$ n'est au programme qu'en filière MP*. Celle-ci donne alors la complétude de $\mathcal{L}(E)$, puisque l'on a vu que E était complet.

Pour les démonstrations de ces deux résultats, ainsi que quelques énoncés donnés en complément, voir la remarque en fin de corrigé.

La convergence de la série $\sum A^n$, jointe à la continuité de la loi \circ par rapport à la deuxième variable, justifie le calcul suivant :

$$\begin{aligned} (I_E - A) \sum_{n=0}^{+\infty} A^n &= \sum_{n=0}^{+\infty} A^n - A \sum_{n=0}^{+\infty} A^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} A^n - \sum_{n=0}^{+\infty} A^{n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} A^n - \sum_{n=1}^{+\infty} A^n \\ (I_E - A) \sum_{n=0}^{+\infty} A^n &= I_E \end{aligned}$$

La continuité par rapport à la première variable de la loi \circ dans $\mathcal{L}(E)$ permet de montrer de manière similaire que

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty} A^n \right) (I_E - A) = I_E$$

ce qui montre en particulier que $I_E - A$ est inversible dans $\mathcal{L}(E)$, d'inverse $\sum_{n=0}^{+\infty} A^n$.

Il faut se convaincre que c'est bien la continuité de l'endomorphisme de $\mathcal{L}(E)$: $B \mapsto A \circ B$ qui permet d'écrire

$$A \sum_{n=0}^{+\infty} A^n = \sum_{n=0}^{+\infty} A^{n+1}$$

En effet, $A \sum_{n=0}^{\infty} A^n = A \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N A^n$ (par définition)

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} A \sum_{n=0}^N A^n$$
 (par continuité)

5 L'équation intégrale (1) s'écrit aussi $(I_E - A)(u) = u_0$. Or, la question précédente montre que l'élément $I_E - A$ est inversible dans $\mathcal{L}(E)$. Ceci prouve que

L'équation (1) admet exactement une solution.